

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

רקטוצורין® פתילות

רקטוצורין® משחה

הרכב

כל פתילה מכילה:

Bismuth subgallate	100 mg
Thymol biiodide	150 mg
Tannic acid	20 mg
Zinc oxide	100 mg
Benzocaine	100 mg
Menthol	5 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Witepsol

Bismuth oxychloride	8.00%
Thymol biiodide	2.00%
Zinc oxide	10.00%
Benzocaine	4.00%
Menthol	0.25%

מרכיבים בלתי פעילים:

Mineral oil, wool fat, purified water, yellow wax, cholesterol, petrolatum

קבוצה תרופתית

תכשירים לטיפול בטחורים לשימוש חיצוני.

פעילות רפואית

הקלה בכאבי טחורים.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הכליה/ מערכת השתן או אם הטחורים מדממים או אם העור מודלק, פגוע או פצוע במקום הטיפול או לידו, אם הינך מתחת לגיל 18 שנים..

אזהרות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אם הינך רגיש/ה ליוזן יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה זו.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם רופא, תוספי תזונה וויטמינים, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פעילות מוגברת של המעיין.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

דימום באזור פי הטבעת (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד! גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

פתילות:

פתילה אחת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה.

משחה:

למרוח את המשחה באזור פי הטבעת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

לא מיועד בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 18 שנים.

שים לב!

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש

משחה:

רחץ/י ויבש/י את אזור פי הטבעת. מרחץ/י כמות קטנה של המשחה ועסה/י בעדינות. סגור/י היטב את השפופרת. רחץ/י ידיך.

אם לפי הוראות הרופא יש להחדיר את המשחה לתוך פי הטבעת, נהג/י כדלקמן : חבר/י את האפליקטור לקצה השפופרת הפתוחה, החדר/י את קצה האפליקטור לתוך פי הטבעת, ולחץ/י בעדינות על השפופרת להוצאת המשחה. הפרד/י האפליקטור מהשפופרת ורחץ/י אותו היטב במים חמים וסבון. סגור/י היטב השפופרת.

פתילות:

הפרד/י פתילה אחת מסרט הפתילות.

להסרת העטיפה - הפרד/י הלשוניות בחלק השטוח של העטיפה. ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה.

שכב/י על צידך והחדר/י הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. רחץ/י היטב ידיך.

הערה: אם הפתילה רכה מידי, ניתן לצננה במקרר במשך כ- 30 דקות או לצננה תחת מים קרים לפני הסרת העטיפה.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריות התרופה איתך.

אל תגרור/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו מתחת ל-25°C.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה

רקטוזורין משחה : 135.34.20466.00

רקטוזורין פתילות : 030.68.20618.00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ת"ד 3190, פתח-תקוה.